




# ILUVIEN®

(Implante intravítreo de acetónido  
de fluocinolona) 0,19 mg



**ILUVIEN podría conservar su visión durante  
más tiempo con menos inyecciones.**

## INDICACIONES

ILUVIEN (implante intravítreo de acetónido de fluocinolona) 0.19 mg está indicado para el tratamiento del Edema Macular Diabético (EMD) en pacientes que han sido tratados previamente con un ciclo de corticosteroides y no tuvieron un aumento clínicamente significativo de la presión intraocular.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- No utilice ILUVIEN si tiene o cree que puede tener una infección en o alrededor del ojo.
- ILUVIEN no debe utilizarse si tiene un glaucoma con una relación vaso-disco superior a 0.8.

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 10 y en la Información de Prescripción Completa adjunta.

# El camino del paciente de ILUVIEN®



## 1. Evaluación: ¿Es usted un candidato?

Usted puede ser candidato a ILUVIEN si se le ha diagnosticado Edema Macular Diabético (EMD).

ILUVIEN está indicado para pacientes que han sido tratados anteriormente con corticosteroides y no tuvieron un aument significativo de la presión ocular. En base a los ensayos clínicos, ILUVIEN ha demostrado ser seguro y eficaz en el tratamiento del EMD durante un máximo de 36 meses con una sola inyección.

Su oftalmólogo realizará una evaluación detallada para evaluar su estado y determinar si es un candidato a ILUVIEN.

## 2. Investigación de las prestaciones del seguro

Su especialista en retina puede presentar una investigación de beneficios con su seguro para evaluar qué cantidad pagará su seguro y el coste para usted. Si no puede pagar la cantidad que su seguro no cubre, existen varias opciones para complementar su seguro actual.

**Para obtener más información,  
visite [ILUVIEN.com](http://ILUVIEN.com)**

---

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

(continuación)

- No debe utilizar ILUVIEN si tiene hipersensibilidad a alguno de los componentes de este producto.
- Las inyecciones en el vítreo del ojo se asocian a una infección ocular grave (endofthalmitis), inflamación ocular, aumento de la presión ocular, glaucoma y desprendimientos de retina. Su oftalmólogo debe vigilarle regularmente después de la inyección.

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 10 y en la Información de Prescripción Completa adjunta.

# El camino del paciente de ILUVIEN®

## 3. Inyección de ILUVIEN

Un especialista en retina administra un único ILUVIEN durante un procedimiento en la consulta. Antes del procedimiento, se limpia el ojo y se aplica una solución anestésica. El implante de ILUVIEN se inyecta en el ojo. Mientras se inyecta, es posible que sienta algo de presión en el ojo.

## 4. Seguimiento

Su médico vigilará su ojo después de la inyección para detectar posibles efectos secundarios, como el desarrollo de cataratas, infección ocular (endofthalmitis), aumento de la presión ocular, glaucoma y desprendimientos de retina.

## 5. La vida con ILUVIEN

Muchos pacientes pueden experimentar una visión sostenida o mejorada, una reducción del edema de la retina y un número significativamente menor de inyecciones oculares después de recibir ILUVIEN.

**Para obtener más información,  
visite [ILUVIEN.com](http://ILUVIEN.com)**

## ILUVIEN es la única opción diseñada para el tratamiento continuo del EMD hasta 36 meses.



### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

(continuación)

- Los corticosteroides pueden aumentar las infecciones oculares secundarias debidas a bacterias, hongos o virus. Informe a su médico si tiene antecedentes de infecciones virales por herpes en el ojo.

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 10 y en la Información de Prescripción Completa adjunta.

# Preguntas para su médico sobre ILUVIEN®

1. ¿Cómo afecta la diabetes al edema macular diabético (EMD)?
2. ¿Hay medidas que pueda tomar para ayudar a frenar la progresión del EMD?
3. ¿Cómo afecta el EMD recurrente a mi visión?
4. ¿Qué opciones tengo para tratar el EMD y mejorar mi visión?
5. Tengo diabetes desde \_\_\_\_ años.  
¿Afectará esto a los tipos de tratamiento de EMD de que dispongo?
6. ¿Cómo puedo reducir el número de inyecciones oculares que recibo actualmente?
7. ¿Cómo funciona ILUVIEN?
8. ¿Puedo recibir ILUVIEN, aunque tenga otra enfermedad ocular o ha ya sido operado?
9. ¿Cuál es el procedimiento de administración de ILUVIEN?
10. ¿Qué tipo de pago o cobertura de seguro está disponible para ILUVIEN?
11. ¿Cuáles son los riesgos y posibles efectos secundarios asociados a ILUVIEN?
12. ¿Cuál es mi plan de seguimiento después de una inyección de ILUVIEN?

**Para obtener más información,  
visite [ILUVIEN.com](http://ILUVIEN.com)**



.....

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

(continuación)

- Si la cápsula posterior del cristalino de su ojo está ausente o desgarrada, el implante de ILUVIEN puede desplazarse a la cámara frontal del ojo.

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 10 y en la Información de Prescripción Completa adjunta.

# Asistencia financiera

## **ILUVIEN® AccessPlus Servicios de Asistencia Financiera**

Si su oftalmólogo le receta ILUVIEN, los Servicios de Asistencia Financiera de AccessPlus pueden ayudar a encontrar opciones para ayudarlo con sus gastos de bolsillo para pacientes con o sin seguro.

### **Programa de copago de ILUVIEN**

El Programa de Copago de ILUVIEN ofrece ayuda para el copago a los pacientes con seguro comercial que reúnan los requisitos necesarios y cuyos gastos de bolsillo superen los 25 dólares.

Usted o su oftalmólogo pueden ponerse en contacto con AccessPlus y elegir la opción 3 al llamar 1-844-445-8843.

### **Programa de asistencia al paciente de ILUVIEN**

El Programa de Asistencia al Paciente de ILUVIEN puede proporcionar un tratamiento GRATUITO a los pacientes calificados que no cuentan con seguro o que lo tienen.

Para solicitar el Programa de Asistencia al Paciente, complete la solicitud del Programa de Asistencia al Paciente de ILUVIEN con su oftalmólogo. Si se determina que es elegible, usted y su oftalmólogo recibirán una carta de aprobación indicando que puede proceder a programar su cita para la inyección.

## Fundaciones independientes de Asistencia financiera

En la vida siempre hay opciones. Eso incluye el pago de un tratamiento adecuado de EMD.

Las fundaciones independientes de asistencia financiera son entidades independientes que proporcionan asistencia financiera a los pacientes asegurados por un proveedor gubernamental.

Póngase en contacto con AccessPlus hoy mismo para obtener más información. Llame al 1-844-445-8843 (opción 3).

**Para obtener más información sobre la ayuda financiera, visite [iluvien.com/support/financial-assistance/](http://iluvien.com/support/financial-assistance/)**

---

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

(continuación)

- Los efectos secundarios más frecuentes notificados en pacientes con edema macular diabético que fueron tratados con corticosteroides, incluyendo ILUVIEN, incluyen cataratas (ILUVIEN 82%; simulación 50%) y aumento de la presión ocular (ILUVIEN 34%; simulación 10%).

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 10 y en la Información de Prescripción Completa adjunta.

# Información de seguridad importante

## INDICACIONES

ILUVIEN® (implante intravítreo de acetónido de fluocinolona) 0.19 mg está indicado para el tratamiento del Edema Macular Diabético (EMD) en pacientes que han sido tratados previamente con un ciclo de corticosteroides y no tuvieron un aumento clínicamente significativo de la presión intraocular.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No utilice ILUVIEN si tiene o cree que puede tener una infección en o alrededor del ojo.
- ILUVIEN no debe utilizarse si tiene un glaucoma avanzado con una relación vaso-disco superior a 0.8.
- No debe utilizar ILUVIEN si tiene hipersensibilidad a alguno de los componentes de ILUVIEN.
- Las inyecciones en el vítreo del ojo se asocian a una infección ocular grave (endoftalmitis), inflamación ocular, aumento de la presión ocular, glaucoma y desprendimientos de retina. Su oftalmólogo debe vigilarle regularmente después de la inyección.

- Los corticosteroides pueden aumentar las infecciones oculares secundarias debidas a bacterias, hongos o virus. Informe a su médico si tiene antecedentes de infecciones virales por herpes en el ojo.
- Si la cápsula posterior del cristalino de su ojo está ausente o desgarrada, el implante de ILUVIEN puede desplazarse a la cámara frontal del ojo.
- Los efectos secundarios más frecuentes notificados en pacientes con edema macular diabético que fueron tratados con corticosteroides, incluyendo ILUVIEN, incluyen cataratas (ILUVIEN 82%; simulación 50%) y aumento de la presión ocular (ILUVIEN 34%; simulación 10%).
- Esta información de seguridad no es completa. Para obtener información adicional sobre seguridad, consulte a su médico y vea la Información de Prescripción Completa de ILUVIEN en [iluvien.com](http://iluvien.com).

*Se le anima a informar a la FDA de los efectos secundarios de los medicamentos recetados a la FDA. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.*

.....

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 10 y en la Información de Prescripción Completa adjunta.

  
ILUVIEN®  
(Implante intravítreo de acetónido  
de fluocinolona) 0,19 mg

Muchos pacientes experimentan una mejora de la visión, una reducción del edema de la retina y un número significativamente menor de inyecciones oculares después de usar ILUVIEN.



Pregunte a su médico sobre ILUVIEN y cómo **una inyección puede tratar de forma continuo del EMD hasta por 36 meses.**



Visite [ILUVIEN.com](https://www.iluvien.com) para obtener más información sobre **la evolución de los pacientes** o para ver cómo los pacientes describen su experiencia con ILUVIEN. Utilice su dispositivo móvil para escanear el código QR.

.....

Consulte la Información Importante de Seguridad en la página 10 y en la Información de Prescripción Completa adjunta.



ILUVIEN es una marca registrada de Alimera Sciences, Inc.  
Copyright © 2022 Alimera Sciences, Inc. Todos los derechos reservados.  
1-844-445-8843. Impreso en EE. UU. US-ILV-MMM-0729-02 05/2022